

## Aufklärung über Verhalten nach einer Zahnentfernung

- Die Betäubung kann Ihre Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen.
- Keine körperlichen Anstrengungen, es könnte zu Nachblutungen kommen.
- Keinen Kaffee, Tee oder Cola trinken sie erhöhen den Blutdruck.
- Keine Milch oder Milchprodukte
- Keinen Alkohol
- Mit dem Essen warten bis die Betäubung nachlässt und dann auf der anderen Seite kauen.
- Den Tupfer nach 30 Minuten entfernen.
- Sollte es dann noch nachbluten, auf ein sauberes Baumwolltaschentuch beißen (mit Druck!), bei starker Blutung wiederkommen.
- Mit kaltem Waschlappen Wange kühlen.
- Schmerztabletten nach Bedarf - **kein Aspirin oder Medikamente mit dem Wirkstoff Acetylsalizylsäure!!!**
- Wundkontrolle gegebenenfalls am nächsten Tag in unserer Praxis.
- Wenn nötig, nach 1 Woche hier in der Praxis Fäden entfernen lassen.

Dr. Kießler und C. Kleinfeldt  
Im Söhregrund 12  
29399 Wahrenholz  
Tel.:05835-1436  
[www.kiessler-kleinfeldt.de](http://www.kiessler-kleinfeldt.de)